



Diabrotica Track

Trappola per la cattura di Diabrotica virgifera

Caratteristiche

Trappole per il monitoraggio delle aree colpite e a rischio di infezione, che possono essere impiegate con o senza il feromone sessuale specifico. L'impiego delle trappole permette di prevedere l'intensità dell'attacco nell'anno successivo e l'eventuale diffusione nelle aziende limitrofe non ancora colpite.

Campi d'applicazione

Cattura di *Diabrotica virgifera* (diabrotica del mais). Le trappole vanno posizionate ad un'altezza di circa 1 metro da terra, sul lato lungo dell'appezzamento e da entrambe le parti a una decina di metri dal bordo dell'appezzamento e a una distanza di almeno 30-40 metri l'una dall'altra. In caso di forti infestazioni, sarà sufficiente 1 trappola per lato dell'appezzamento. Per basse infestazioni o monitoraggio di nuove possibili infestazioni, è consigliabile aumentare questo numero a 2-3 trappole per lato. Le trappole vanno controllate e pulite almeno settimanalmente. La capsula di feromone va invece sostituita ogni 45 giorni.

CONTENUTO 4 pannelli cromotropici gialli collati 20x24,5 cm, 2 feromoni e 2 fili di ferro

CONFEZIONI Cartone da 34 pz

SERBIOS SRL

Via E. Fermi, 112 Tel +39 0425 590622
45021 Badia Polesine RO Fax +39 0425 590876
Italy info@serbios.it

www.serbios.it