super Forest

Trappola per la cattura degli scolitidi



Caratteristiche

Trappola adatta per la cattura di: *Ips typographus, Polygraphus poligraphus, Pityogenes chalcographus, Trypodendron lineatum, Tomicus piniperda, Tomicus minor*. Può essere utilizzata per il monitoraggio e la cattura massale.

Campi d'applicazione

Monitoraggio e cattura di *Ips typographus, Polygraphus poligraphus, Pityogenes chalcographus, Trypodendron lineatum, Tomicus piniperda, Tomicus minor*. Nel primo caso posizionare 3-4 trappole/ha, nel secondo caso 12-15. Posizionare le trappole ad un’altezza da terra di circa 150 cm e mantenere tra loro una distanza di circa 25 metri. La piastrina di feromone deve essere appesa all’interno, avendo cura di posizionarla a circa metà trappola. Va installata nella seconda metà di marzo e i feromoni rimangono attivi per 5-6 settimane. Controllare periodicamente la trappola per mantenerla pulita e segnare le catture.

CONTENUTO	Un corpo cattura completo
CONFEZIONI	Cartone da 5 pz

Updated: 2026/11

SERBIOS SRL

Via E.Fermi, 112 Tel +39 0425 590622
45021 Badia Polesine RO Fax +39 0425 590876
Italy info@serbios.it

www.serbios.it